

Japanese Unexamined Patent Publication No.: 63-152372


Publication Date : June 24, 1988

Title of Invention: Salt of Diclofenac and Cyclic Organic
Base, and Pharmaceutical Composition
Containing the Same

Application No.: 62-285664

Date of Filing : November 13, 1987

Summary: A salt of diclofenac(2-[(2,6-dicyclophenyl)-amino]-
benzeneacetic acid) and a cyclic organic base represented the
following formula (I):



[where X is a radical represented by $(\text{CH}_2)_m$ (where m is 0, 1 or 2), oxygen, sulfur or NR (where R is an alkyl of $\text{C}_1 - \text{C}_4$), and n is 2 or 3]

⑫ 公開特許公報 (A)

昭63-152372

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)6月24日

C 07 D 295/02

A 61 K 31/205

31/40

31/435

C 07 C 99/00

101/447

C 07 D 295/02

A B E

A-6742-4C

7330-4C

7451-4H

Z-6742-4C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全4頁)

⑮ 発明の名称 ジクロフェナックと環状有機塩基との塩、およびそれを含有する薬剤組成物

⑯ 特 願 昭62-285664

⑰ 出 願 昭62(1987)11月13日

優先権主張 ⑱ 1986年11月13日 ⑲ イタリア (I T) ⑳ 22320 A/86

㉑ 発 明 者 アントニオ・ジジョツ スイス国、ヴェジア (テイチーノ) (無番地)
テイ

㉒ 発 明 者 ミケーレ・デイ・シエ イタリア国、20080 シスリアーノ (エムアイ) ヴィア・ガリバルディ 17

㉓ 出 願 人 アルテルゴン・エス、 スイス国、06903 ルガノ、ヴィア・ドガーナ・ヴェツチ
エイ、 ア 2

㉔ 代 理 人 弁理士 山下 稔平

明 細 書

1. 発明の名称

ジクロフェナックと環状有機塩基との塩、
およびそれを含有する薬剤組成物

2. 特許請求の範囲


(1) ジクロフェナック (2-[(2,6-ジクロロフェニル)-アミノ]-ベンゼンアセチクアシッド) と一般式 (I)、



[式中、Xは式 (CH₂)_m で示される基 (ここで m は 0、1 または 2)、酸素、硫黄または NR (ここで R は C₁ ~ C₄ のアルキル基) であり、n は 2 または 3 である]

で示される環状有機塩基との塩、

(2) ジクロフェナック (2-[(2,6-ジクロロフェニル)-アミノ]-ベンゼンアセチクアシッド) を適宜な有機溶媒に溶解し、一般式 (I)、



[式中、Xは式 (CH₂)_m で示される基 (ここで m は 0、1 または 2)、酸素、硫黄または NR (ここで R は C₁ ~ C₄ のアルキル基) であり、n は 2 または 3 である]

で示される環状有機塩基との塩を加え、両化合物を反応させ、溶媒を除去し結晶化して生成物を得ることを特徴とするジクロフェナックと該環状有機塩基との塩の製造方法、

(3) 前記有機溶媒がアセトン、エタノールまたはクロロホルムである特許請求の範囲第2項記載の製造方法、


(4) 環状有機塩基 (I) がジクロフェナックに対し当量あるいは少し過剰な量加えられることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の製造方法、

(5) 前記反応は包囲の温度で 0.5 ~ 3 時間操作して得られることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の製造方法、

(6) 真空において 45℃の温度で蒸留して溶媒を除去することを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の製造方法。

(7) 前記結晶化は溶媒を除去した残留物を攪拌下ヘキサンまたは石油エーテルで処理して行なうことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の製造方法。

(8) 製薬上受容可能な無効成分と共に、ジクロフェナックと一般式(I)。



[式中、Xは式(CH₂)_mで示される基(ここでmは0、1または2)、酸素、硫黄またはNR(ここでRはC₁～C₄のアルキル基)であり、nは2または3である]

で示される環状有機塩基との塩を治療上有効な量含有する薬剤組成物。

(9) ジクロフェナックと前記環状有機塩基との塩を単位適量当りジクロフェナック10～200mgに相当する量含有することを特徴とする特許請求の範囲第8項記載の組成物。


3

これらの化合物の特徴の1つは、これらが酸の存在下で環化して相応するインドリノンになることである。開環形態で安定性を得るため、例えば前記特許に記載されているように、これらを脂性の無い有機あるいは無機の塩基で塩化する。

しかし、この特許には該塩の水に対する溶解度についての情報は与えられておらず、また該特許が教受するところを利用できるようになってから数年が経過したにもかかわらず、未だ水溶性のジクロフェナックの薬剤組成物は市場に送り出されていない。

[問題点を解決するための手段]

発明者等はジクロフェナックを一般式(I)。



[式中、Xは式(CH₂)_mで示される基(ここでmは0、1または2)、酸素、硫黄またはNR(ここでRはC₁～C₄のアルキル基)であり、nは2または3である]

で示される環状有機塩基で塩化することにより、

5

求の範囲第8項の組成物。

(10)経口投与用に少量の水に溶解して溶液となるように、顆粒状に製造され水を通さない袋に入れられたものであることを特徴とする特許請求の範囲第8項記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明はジクロフェナックと環状有機塩基との塩、およびそれを含有する薬剤組成物に関する。

さらに特別には、本発明は種々の薬剤の形状の、好ましくは経口投与用に即座に溶液として用いるために顆粒に形成されたジクロフェナックと環状有機塩基との塩に関する。

[従来技術]

ジクロフェナック(2-[(2,6-ジクロロフェニル)-アミノ]-ベンゼンアセチックアシッド)はかなり以前から知られている消炎剤であり、この消炎剤は極めて多数の他の化合物と共に分類上米国特許第3,558,690号の一般式に入る。

4

水溶性に優れたジクロフェナックを得ることができることを見い出した。これは、米国特許第3,558,690号に包含され、ジクロフェナックと樹脂から見れば一般式(I)の塩基に非常に似ている2-アミノ-エタノールやピロリジンのような塩基との塩が事實上水に不溶であるという事実にかんがみれば非常に驚くべきことである。

現在用いられている経口投与用錠剤に対比して、ジクロフェナックと式(I)の塩基との塩で特に予見できなかった進歩した点は、顆粒状に調製し水が通らない袋に入れることにより、効力が十分に維持されているときに胃に滞留を引き起さない性質を有する水溶液を即座に調製できることである。

薬物を摂取する患者から危険を取り除く性質に示される非常に大きい進歩は、製薬上の応用により明らかに少なからぬ利益となる。

従って、ジクロフェナックと式(I)の塩基との塩は本発明の課題を構成する。さらに、該塩を治療上有効な適量含有する薬剤組成物は本発明の

6

課題を構成する。

この塩の調製方法は工業的に見れば極めて単純なものであり、ジクロフェナックを適宜な有機溶媒に溶解し、式(1)の塩基を加え、両化合物を反応させ、溶媒を除去し結晶化して生成物を得ることを特徴とする。

ジクロフェナックの溶解に適宜な有機溶媒はアセトン、エタノールおよびクロロホルムである。塩基はジクロフェナックに対して当量あるいは少し過剰な量を用いる。反応は包囲の温度で0.5～3時間攪拌して導かれる。溶媒は真空において35～45℃の温度で蒸留により除去する。蒸留の残留物を強攪拌下ヘキサンまたは石油エーテルで処理して塩を結晶化する。

こうして得られた未精製の塩をアセトンに溶解して、ヘキサンまたは石油エーテルで結晶化する。

ジクロフェナックとヒドロキシエチルピロリジン(1D)またはヒドロキシエチルピペリジン(1P)との塩の溶解特性を、ジクロフェナック

7

相当する有効成分量を含む。

好ましい薬剤形状の例は、水を通さない材質の袋に入れた顆粒であり、それを経口投与用に溶解とするため少量の水に溶解する。

無効成分に加うるに、該組成物は防腐剤、安定剤、保湿剤、乳化剤、浸透圧調整剤、緩衝剤、ダイスタッフ(dysstuffs)、甘味剤、香味剤を含むことができる。

以下の実施例は、本発明の実例を限定して記述するものではない。

実施例 1

ジクロフェナックとヒドロキシエチルピロリジンとの塩の調製

14.75g(49.8モル)の2-[(2,6-ジクロロフェニル)-アミノ]-ベンゼンアセチックアシッド(ジクロフェナック)をアセトン(50ml)に溶解し、5.75g(49.9モル)の新しく蒸留したヒドロキシエチルピロリジンを加えて溶液を得た。

その溶液を包囲の温度で1時間攪拌下に保持し

9

とソジウム(SD)ピロリジン(PD)または、2-アミノエタノール(AD)の塩と比較して以下の表に示す。

化合物	溶解度 (% w/v)	溶液 pH	沈殿開始
1D	> 50	7.5	24時間
1P	> 20		
SD	1.36	7.6	
PD	実質上不溶		
AD	実質上不溶		

ジクロフェナックと式(1)の塩基との塩はシエルフライフにも使われている。

本発明による薬剤組成物は、製薬上受容可能な液体、有機あるいは無機型の固体無効成分と共に、治療上有効な量のジクロフェナックと式(1)の塩基との塩を含むものであり、経口投与が可能である。好ましくは、該組成物は単位適量当たり、10～200mgのジクロフェナックに

8

た後、40℃、真空で溶媒を除去した。

油状の残留物をヘキサン(100ml)で処理し、得られた混合物を油状が結晶状の固体になるまで強攪拌下に保持し、それを濾過により分別し乾燥した。融点57～58℃の生成物が17g(理論量の83%の収率)得られた。

このようにして得られた未精製の生成物をアセトン(50ml)に溶解し、動物炭で脱色し濾過した。溶液を真空において蒸発させ、残留物を前述のようにヘキサンで処理した。ジクロフェナックとヒドロキシエチルピロリジンとの塩は融点97.5～100℃で純粋な状態で得られた。

実施例 2

ジクロフェナックと1-(2-ヒドロキシエチル)-ピペリジンとの塩の調製

8.9gの2-[(2,6-ジクロロフェニル)-アミノ]-フェニルアセチックアシッドを220mlのエチルアセテートに溶解した溶液を、1.88gの1-(2-ヒドロキシエチル)-ピペリジンを20mlのエチルアセテートに溶解した溶液で

攪拌しながら処理した。

30分後溜んだ溶液を減圧下、容積が100
mlなるまで濃縮し、さらに100 mlのジエチ
ルアセテートで希釈した。2-[(2,6-ジクロ
ロフェニル)-アミノ]-フェニルアセチックア
シッドの1-(2-ヒドロキシエチル)-ビペリ
ジン塩の結晶が沈殿したので、それを濾別した。
融点109~111℃、水に対する溶解度20%
w/v。

実施例3

ジクロフェナックとヒドロキシエチルピロリジ
ンとの塩を含有する顆粒の調製

以下の組成を有する顆粒を調製した。

ジクロフェナックとヒドロキシ

エチルピロリジンとの塩	70mg
ソルビトール	1798mg
アスパルテーム(aspartame)	50mg
ポリエチレングリコール6000	150mg
E 124	1mg
E 110 HC	1mg

11

50mgを含有し飲用に適した溶液となる。

香味剤

130mg

70gのジクロフェナックとヒドロキシエチル
ピロリジンとの塩、1.798kgのソルビトールおよ
び50gのアスパルテームを鎖製立方体混合機で
20分間混合した。

150gのポリエチレングリコール6000、1g
のE 124 および1gのE 110HCを攪拌下250
mlの沸騰水に溶解した。

このようにして調製した固体混合物と溶液を流
動床造粒機中で100 mlの混合用の水を用い混
合した。このようにして得られた顆粒をメッシュ
の幅1mmの振動ふるいによりふるいにかけた。

130gの香味剤を同じふるいによりふるい分
け、上記顆粒と共に立方体混合機で20分間混合
した。

このようにして得られた顆粒を水を通さない材
質の袋に、各袋に2.2gつづ入れるように分配し
た。

使用するときには、各袋の内容物は容易に少量
の水に溶解して、酸の形としてジクロフェナック

12